

กระรังลายตุ๊กแก: *Longtooth grouper* *Epinephelus bruneus* (Bloch, 1793)



Synonyms: *Epinephelus moara* (Bloch, 1793)
Serranus moara (Bloch, 1793)

ข้อมูลพื้นฐาน

กระรังลายตุ๊กแกที่พบ เป็นปลาที่รวบรวมได้ ตามแนวชายฝั่งจังหวัดสตูล ชาวประมงสตูลมักเรียกกันหลายชื่อ เช่น “ปลาทูกแก” หรือ “เกาสีน” หรือ “ขี้มัน” และมีความคล้ายคลึงกับปลากะรังลายหินอ่อน ขนาดที่รวบรวมได้ 50-100 g ใช้เวลาเลี้ยงในกระชังประมาณ 6 เดือน ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 g สามารถขายได้ กก.ละ 200 บาท




ขนาดใหญ่สุด: 128.0 cm (TL)

สิ่งแวดล้อม: อาศัยในแนวกองหินชายฝั่ง และทะเลลึก ความลึกอยู่ในช่วง 20-200 m

การแพร่กระจาย: พบในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ: เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน

ลักษณะ: หนามแข็งบนครีบหลังทั้งหมด: 11-11;
ครีบอ่อนด้านหลังทั้งหมด: 13-15;
หนามแข็งครีบกัน: 3; ครีบอ่อนด้านกัน: 8

ชีววิทยา: พบทั่วไปในแหล่งกองหินใต้ทะเล และพบในแหล่งที่ทะเลเป็นพื้นโคลน ในระยะวัยรุ่น พบในแหล่งน้ำตื้นๆ และเลี้ยงเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศญี่ปุ่น



ที่มา: <http://www.fishbase.org>