

# กะพงแดง: *Mangrove red snapper* *Lutjanus argentimaculatus* (Forsskal, 1775)



Synonyms: *Sciaena argentimaculatus* (Forsskal, 1775)

## ข้อมูลพื้นฐาน


ปลากะพงแดงเป็นปลาน้ำกร่อยขนาดใหญ่ มีการเลี้ยงกันมานาน กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงแดงได้ ลูกพันธุ์สามารถซื้อได้จากโรงเพาะฟักและรวบรวมจากธรรมชาติ ปัจจุบันปลากะพงแดง มีการเลี้ยงในวงแคบ ๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องลูกพันธุ์สัตว์น้ำ



**ขนาดใหญ่สุด:** 150.0 cm (TL)

**สิ่งแวดล้อม:** อาศัยในแนวปะการัง กองหินใต้ทะเล และมหาสมุทร พบในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ความลึกในช่วง 10-120 m

**การแพร่กระจาย:** พบในแถบ อินโด-แปซิฟิกตะวันตก: บริเวณแอฟริกาตะวันออก ถึงซามัว และ เกาะ Line, ด้านเหนือจดเกาะริวคิว และ ด้านใต้จดออสเตรเลีย และแพร่ไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ประเทศเลบานอน



**ลักษณะ:** หนามแข็งบนครีบหลังทั้งหมด: 10-10; ครีบอ่อนด้านหลังทั้งหมด: 13-14; หนามแข็งครีบกัน: 3; ครีบอ่อนด้านกัน: 7-8

**ชีววิทยา:** ไข่อ่อนและวัยรุ่นจะอาศัยตามป่าชายเลน เมื่อโตขึ้นมักพบตามแนวปะการัง และอพยพออกไปอยู่แนวกองหินใต้ทะเลลึก บางครั้งพบ อยู่ลึกกว่า 100 m กินลูกปลา และพวกกุ้งเป็นอาหาร เป็นปลาเศรษฐกิจในภูมิภาค อินโดแปซิฟิก

ที่มา: <http://www.fishbase.org> , <http://fishdb.sinica.edu.tw>

โครงการจัดการเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปี 2549

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เก้าแสน ซอย 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0-7431-1895, 0-7431-1340 โทรสาร. 0-7444-2054

เว็บไซต์ <http://www.nicaonline.com> & [www.sklonline.com](http://www.sklonline.com)